

โปรแกรมวัคซีนไก่ไข่

โปรแกรมการใช้อาหาร

อายุไก่	ชนิดวัคซีน	วิธีการให้วัคซีน
ระยะไกรุ่น		
1 วัน	มาเรียซ์	ฉีดเข้าใต้ผิวหนังคอ (จากโรงฟัก)
	นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ	สเปรย์ (จากโรงฟัก)
5-7 วัน	นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ	หยอดตา
	นิวคาสเซิลเชื้อตาย	ฉีดเข้าใต้ผิวหนังคอ
14 วัน	กัมโบโร	ละลายน้ำ
21 วัน	กัมโบโร	ละลายน้ำ
28 วัน	นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ	หยอดตา
	นิวคาสเซิลเชื้อตาย	ฉีดเข้าใต้ผิวหนังคอ
	ฝีดาษ	แทงปีก
8 สัปดาห์	หัวัดหน้าบวม	ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก
	นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ	หยอดตา
	นิวคาสเซิลเชื้อตาย	ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก
9-10 สัปดาห์	กล่องเสียงอักเสบ	หยอดจมูก
	ฝีดาษ+ไซสมงอักเสบ	แทงปีก
13-14 สัปดาห์	นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ	หยอดตา
	นิวคาสเซิล+หลอดลม + ไซนัส+หัวัดหน้าบวม	ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก
	ระยะไก่ไข่	
18-19 สัปดาห์	นิวคาสเซิลเชื้อตาย	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังคอ
ทุก 4-6 สัปดาห์	นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ	สเปรย์หรือหยอดตา

อายุ (สัปดาห์)	เบอร์อาหาร	ปริมาณการกินอาหาร		น้ำหนักตัว(กรัม)		ชั่วโมงแสง
		กรัมต่อวัน	สะสม(กก.)	เกณฑ์ต่ำ	เกณฑ์สูง	
1	6521/6521S	11	0.08	65	68	22
2		11	0.20	110	120	21
3		25	0.37	200	210	20
4		32	0.60	285	300	19
5		37	0.85	380	400	18
6		42	1.15	470	500	17
7	6521	46	1.47	560	590	16
8		50	1.82	650	680	15
9		54	2.20	740	775	14
10		58	2.60	830	865	13
11	6522	61	3.03	920	960	12
12		64	3.48	1,000	1,050	12
13		67	3.95	1,100	1,140	12
14		70	4.44	1,175	1,230	12
15		73	4.95	1,270	1,320	12
16		76	5.48	1,350	1,410	12
ควรมียุ่ไก่อายุ 16-17 สัปดาห์						
17	6324	80	6.04	1,430	1,505	12
18		84	6.63	1,500	1,600	12

ระยะไก่ไข่					
อายุไก่ (สัปดาห์)	เบอร์อาหาร	การกินอาหารเฉลี่ย กรัมต่อวัน	น้ำหนักตัว(กรัม)	ชั่วโมงแสง	
1	6324	84	1,500	12	
2		90	1,580	13	
3		96	1,640	14	
4		106	1,705	15	
5		115	1,755	15	
35		115	1,900	15	
35-ปลด	6324/6325	115	1,965	15	
60		115	2,000	15	

หมายเหตุ

โปรแกรมวัคซีนนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่และการระบาดของโรค ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์

การป้องกันโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

- ควรสร้างฟาร์มห่างจากแหล่งโรคระบาด
- มีระบบการป้องกันโรคที่ดี สามารถป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับยานพาหนะ คน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสัตว์พาหนะต่างๆ เช่น นก หนู เป็นต้น
- มีการจัดการด้านสุขาภิบาล การให้น้ำ - อาหาร รวมถึงการกำจัดมูลไก่และซากไก่ที่ถูกวิธี
- มีโปรแกรมวัคซีนที่เหมาะสมและตรงกับโรค รวมทั้งมีการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกวิธี


รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

ชื่อร้าน.....

โทร

หมายเหตุ

- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ช่วงไกรุ่น ถ้าน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานสามารถเปลี่ยนเบอร์อาหารได้เร็วขึ้น
- ช่วงเปลี่ยนเบอร์อาหารควรผสมอาหารเบอร์เก่ากับเบอร์ใหม่ 3-5 วัน
- น้ำหนักตัวไก่ที่โตขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพลูกไก่ สภาพแวดล้อม ปริมาณและคุณภาพอาหาร การป้องกันโรค-พยาธิ เป็นต้น



อาหารไก่ไข่
ทางเลือกที่ดีที่สุด ของการเลี้ยงสัตว์



บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
128 ถนนเย็นจิตร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 02-036 4577, 02-036 4553 โทรสาร. 02-036 4600
www.cpfed.com

อาหารไก่รุ่น



6521

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับไก่ไข่แรกเกิดถึงอายุ 5 สัปดาห์

อาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกไก่ไข่ สามารถเลี้ยงลูกไก่แรกเกิดจนถึงอายุ 10 สัปดาห์ มีลักษณะเป็นเม็ดบีดขนาดเล็ก เป็นอาหารที่ผู้เลี้ยงให้การยอมรับว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงลูกไก่ไข่ พัฒนาโครงสร้างและความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ทำให้ลูกไก่แข็งแรง โตเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เต็มโตเป็นไก่สาวที่ให้ผลผลิตสูงต่อไป



6522

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับไก่ไข่อายุมากกว่า 5 สัปดาห์ ถึง 16 สัปดาห์

อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่รุ่น ไข่ต่อเนื่องจากอาหาร 6521 อาหารมีลักษณะเป็นเม็ดบีดขนาดใหญ่ มีความน่ากินสูง มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่รุ่นในวัยที่มีการพัฒนาด้านระบบสืบพันธุ์ ทำให้ได้ไก่สาวที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมในการให้ไข่



6126

หัวอาหารไก่ไข่ สำหรับไก่ไข่อายุมากกว่า 19 สัปดาห์ขึ้นไป

เป็นหัวอาหารไก่ไข่เข้มข้น สำหรับไก่ไข่ที่มีอายุตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ใช้ผสมกับข้าวโพด รำละเอียดและหินบดหรือหินเกล็ด โดยมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่า 6324 และ 6325

หัวอาหารไก่ไข่

อาหารไก่ไข่ ชนิดผง



6324

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สำหรับไก่ไข่อายุมากกว่า 18 สัปดาห์ขึ้นไป

เป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ชนิดเข้มข้น มีลักษณะเป็นผง ใช้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่เริ่มให้ไข่ จนถึงอายุไก่ 80 สัปดาห์ (อายุไข่ 60 สัปดาห์) มีคุณค่าทางอาหารสูง ทำให้เปอร์เซ็นต์ไข่สูง ให้ไข่ยืนนาน น้ำหนักไข่ดี



6325

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สำหรับไก่ไข่อายุมากกว่า 19 สัปดาห์ขึ้นไป

เป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ระยะไข่ มีลักษณะเป็นผง เหมาะสำหรับไก่ไข่ตั้งแต่เริ่มไข่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไก่ไข่อายุ 60 สัปดาห์ (อายุไข่ 40 สัปดาห์) ขึ้นไป หรือเมื่อไก่ไข่มีผลผลิตต่ำกว่า 75% เพื่อเสริมสร้างเปลือกไข่ให้แข็งแรง

อาหารไก่ไข่ ชนิดเม็ด



6524

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สำหรับไก่ไข่อายุมากกว่า 18 สัปดาห์ขึ้นไป

เป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ชนิดเข้มข้น มีลักษณะเป็นเม็ด ใช้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่เริ่มให้ไข่ จนถึงอายุ 80 สัปดาห์ (อายุไข่ 60 สัปดาห์) มีคุณค่าทางอาหารสูง ทำให้เปอร์เซ็นต์ไข่สูง ให้ไข่ยืนนาน น้ำหนักไข่ดี



6525

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สำหรับไก่ไข่อายุมากกว่า 19 สัปดาห์ขึ้นไป

เป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ระยะไข่ มีลักษณะเป็นเม็ด เหมาะสำหรับไก่ไข่ตั้งแต่เริ่มไข่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไก่ไข่อายุ 60 สัปดาห์ (อายุไข่ 40 สัปดาห์) ขึ้นไป หรือเมื่อไก่ไข่มีผลผลิตต่ำกว่า 75% เพื่อเสริมสร้างเปลือกไข่ให้แข็งแรง



ส่วนผสม	ระยะเวลาและสัดส่วนการผสม			
	ไก่ไข่อายุระหว่าง 19-55 สัปดาห์	ไก่ไข่อายุตั้งแต่ 56 สัปดาห์ขึ้นไป		
หัวอาหาร 6126	21.5	24.0	21.5	24.0
ข้าวโพด	56.5	56.7	56.5	56.7
รำละเอียด	15.0	11.3	15.0	11.0
หินเกล็ด	7.0	8.0	7.0	8.3
รวม	100	100	100	100