

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้อุกแพะกินน้ำนมเหลืองภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอดให้มากที่สุดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอุกแพะ
2. ควรรีบหัดให้อุกแพะกินอาหารเสริมที่อายุ 2 สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของกระเพาะหมัก
3. ควรหย่านม และแยกอุกแพะที่อายุ 3 เดือน และเสริมอาหารซีพี 991-18 เพื่อความสมบูรณ์ ของอุกแพะ การแยกอุกแพะเร็วจะทำให้มีแพะกลับมาเป็นสัด
4. ควรหัดให้อุกแพะกินอาหารทบานคุณภาพดีในช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนหย่านม และจัดหน้าถะอาหาร ให้อุกแพะกินอย่างเต็มที่
5. ควรแยกอุกแพะเพศผู้ และเพศเมียออกจากกัน เมื่ออายุ 4 เดือน เพื่อไม่ให้แพะผสมพันธุ์กันเอง ก่อนถึงอายุที่เหมาะสม
6. เมี้ยแพะที่ตั้งท้องมากกว่า 3 เดือน ควรเพิ่มอาหาร เป็นพิเศษเพื่อความสมบูรณ์ของเมี้ยและลูก



ซีพี

อาหารแพะ

ทุกครั้งที่เลี้ยงสัตว์นิยมถึง

ซีพีเอฟ



ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ซีพี



บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์: ๐๕๒-๔๘๘๙๖๖๖๖ โทรสาร: ๐๕๒-๔๘๘๐๔๖๐
www.cpfeed.com

ซีพี
991-18

สำหรับลูกแพะ
แรกเกิด - 4 เดือน

- ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย
- ผลิตจากวัตถุดินที่ปั่นอย่างเข้มข้น
- มีคุณค่าทางอาหารสูง
- มีวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน
- เสริมสร้างกระดูกและโครงสร้าง



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ความชื้นไม่มากกว่า 13% | โปรตีนไม่น้อยกว่า 18% |
| ไขมันไม่น้อยกว่า 3.5% | เยื่อไขไม่มากกว่า 8% |

โปรแกรมการใช้อาหารแพะ ลูกแพะแรกเกิดถึงอย่างเป็น

| อายุ | อาหารที่แนะนำ | ปริมาณ(ตัว/วัน) |
|--------------------------|------------------|---|
| แรกเกิด - 3 วัน | นมแม่เหือด | 10-12% น้ำหนักตัว |
| 4 วัน - 2 สัปดาห์ | นมสกัดหรือนมผง | เริ่มให้กินวันละน้อย |
| 2 สัปดาห์ขึ้นไป - หยาดนม | นมนมสกัดหรือนมผง | |
| | ซีพี 991-18 | เริ่มให้กินวันละน้อย แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณ |
| | หญ้าคุณภาพดี | กินเสริม |

การใช้นมผง : นวดคลายลม 1:7 นมที่ให้ควรอุ่นประมาณ 40 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ

- ควรให้ลูกแพะได้รับนมน้ำเหือด รวมเริ่วที่สุดหลังคลอด
- ในวัย 2 สัปดาห์แรก ควรให้ลูกแพะได้อยู่กับแม่แพะตลอดเวลา เพื่อให้ลูกแพะได้กินนมอย่างเต็มที่

ซีพี
991-14

สำหรับแพะรุ่น แพะบุน
แพะก้อนว่าง และแพะ
ไม่เกิน 3 เดือน

- ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย
- มีคุณค่าทางอาหารสูง
- มีวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน
- トイไวน้ำหนักดี
- สร้างกล้ามเนื้อ



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ความชื้นไม่มากกว่า 13% | โปรตีนไม่น้อยกว่า 14% |
| ไขมันไม่น้อยกว่า 3% | เยื่อไขไม่มากกว่า 10% |

โปรแกรมการใช้อาหารแพะ แพะรุ่น แพะบุน แพะก้อนว่างและแพะไม่เกิน 3 เดือน พ่อพิบูล

| อายุ | ซีพี 991-14 (กรัม/ตัว/วัน) | อาหารขยาย |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| แพะรุ่นพันธุ์แพะบุน | | |
| ● น้ำหนักตัว 20-30 กิโลกรัม | 550-700 กรัม | หญ้าสด/ฟางข้าว กินเต็มที่ |
| ● น้ำหนักตัว 31-40 กิโลกรัม | | |
| ● น้ำหนักตัว 41-50 กิโลกรัม | | |
| แพะระยะพัฒนาตั้งแต่ 3 เดือน | | |
| ● แพะสาวก้อนแรก | 400-500 กรัม | หญ้าสด/ฟางข้าว กินเต็มที่ |
| ● แพะน้ำ | 450-500 กรัม | |
| แพะพ่อพันธุ์ | 450-1,000 กรัม | หญ้าสด/ฟางข้าว กินเต็มที่ |

หมายเหตุ

- ปริมาณอาหารขั้นต่ำให้เท่ากับคุณภาพและปริมาณอาหารหายากที่ได้รับ
- การเสริมอาหารให้กับแพะในระยะพัฒนาซึ่งเพิ่มอัตราการผลิตติดลูกแพะ

ซีพี
991-16

สำหรับแพะรีดนม
และแพะก้อนมากกว่า
3 เดือน

- ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย
- ให้โปรตีนและพลังงานสูง
- มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น
สำหรับแพะท้องและแพะระยะให้นม



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ความชื้นไม่มากกว่า 13% | โปรตีนไม่น้อยกว่า 16% |
| ไขมันไม่น้อยกว่า 3% | เยื่อไขไม่มากกว่า 10% |

โปรแกรมการใช้อาหารแพะ แพะก้อนมากกว่า 3 เดือน – แพะให้บุบ

| ระยะเวลาให้ผลผลิต | ซีพี 991-16 (กรัม/ตัว/วัน) | อาหารขยาย |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| แพะตั้ง 3 เดือน ขึ้นไป - คลอด | 600-800 กรัม | หญ้าสด กินเต็มที่ |
| แพะระยะเลี้ยงลูก/ให้นม | 800-1,500 กรัม | หญ้าสด กินเต็มที่ |

หมายเหตุ

- การเสริมอาหารให้กับแพะในระยะอุ้มท้อง 1 เดือนก่อนคลอด ช่วยลดปัญหา "ก้อนเป็นพิษ" หลังคลอด
- ปริมาณอาหารที่ให้กับแพะในระยะเลี้ยงลูก/ให้น้ำนม จะขึ้นอยู่กับจำนวนลูก
ที่คุณมี/ปริมาณน้ำนมที่ผลิต